



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	9

^{*} El apartado correspondiente a visitas y actividades especiales se ha suprimido en el boletín de este mes, ya que debido a las restricciones decretadas por el estado de alarma a causa del COVID-19, el acceso al paraje se ha prohibido hasta nuevo aviso y por tanto no se han realizado ningún tipo de visitas o actividades de educación ambiental.




1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE L	BAJO	
BALSA	ALTO	
TORRE B	MEDIO	
	Norte	ALTO
CLOT DE GALVANY	Sur	ALTO
	Central	ALTO
	Limícolas	ALTO
CHARCAS ARTIFICIALES	Anátidas	ALTO
	Fartet	NULO

OBSERVACIONES

Durante el mes de Mayo se han recogido por lluvias un total de 43 l/m², supera en mas de 40 litros a las precipitaciones recogidas en Mayo del año anterior. Las charcas artificiales mantienen un nivel alto salvo alguna fluctuación puntual. Las charcas naturales tienen un nivel alto salvo el Fondet de la Senieta que ha ido bajando de nivel hasta quedar prácticamente seco a final de mes. El camino del saladar sigue inundado puesto que las charcas NW, SW y central siguen conectadas entre si.





2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM				
Especie	TOTAL			
Alcatraz atlántico	1			
Cormorán grande	2			
Cormorán moñudo	2			
Vuelvepiedras común	1			
Gaviota patiamarilla	8			
Larus sp	36			
Charrán patinegro	31			
Total	81			

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL				
Especie	TOTAL			
Cormorán moñudo	7			
Gaviota de Audouin	17			
Gaviota patiamarilla	17			
Charrán común	4			
Larus sp	30			
TOTAL	75			







Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)

El chorlitejo patinegro es un ave limícola típica de zonas costeras, saladares y lagunas. Es de pequeño tamaño, pico corto y patas oscuras con las que corretea velozmente buscando pequeñas presas que suelen ser insectos, moluscos, crustáceos o lombrices. Se reproduce de abril a agosto utilizando habitualmente las dunas como zona de nidificación aunque también hace sus nidos en lagunas y saladares de interior. La presión antrópica ocasiona muchas molestias a esta especie, las continuas "limpiezas de playas" para su uso recreativo, la destrucción de hábitats provocada por la urbanización descontrolada entre otros muchos factores, contribuyen al declive de la población silvestre de chorlitejo patinegro que ya se encuentra catalogado como vulnerable.





MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	6	
Aguilucho lagunero occidental	1	
Alcaraván común	2	
Alcatraz atlántico	1	
Alcaudón común	2	
Andarríos chico	1	
Avetorillo común	1	
Avoceta común	6	
Carricero tordal	3	
Cerceta pardilla	43	
Cernícalo vulgar	1	
Charrán común	4	
Chorlitejo patinegro	3	
Cigüeñuela común	21	
Cormorán moñudo	6	
Correlimos tridáctilo	2	
Cuco común	1	
Flamenco común	4	

Fumarel cariblanco	84
Garceta grande	15
Garcilla cangrejera	2
Garza imperial	1
Garza real	2
Gaviota de Audouin	10
Golondrina común	18
Golondrina dáurica	4
Malvasía cabeciblanca	13
Martinete común	4
Morito común	12
Papamoscas gris	1
Pardillo común	12
Rascón europeo	1
Somormujo lavanco	22
Tarro blanco	8
Tórtola europea	4
Zampullín cuellinegro	12



OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagarto ocelado

Rana común

Galápago leproso

Lagartija colirroja

Salamanquesa común

Lagartija cenicienta

Ardilla roja

Jabalí

Conejo

Abejorro carpintero (Xylocopa sp)

Caballito del diablo (Ischnura elegans)

Libélula (Anax parthenope)

Libélula (Crocothemis erythraea)

Libélula (Diplacodes lefebvrii)

Mariposa crimson manchado (Utetheisa pulchella)

Mariposa de la col o blanca de la col (Pieris brassicae)

Mariposa de los muros, maculada (Pararge aegeria)

Mariposa ícaro (Polymmatus icarus)

Mariposa vanesa (Vanessa atalanta)











Mariposa crimson manchado (*Utetheisa pulchella*), Mariposa de la col o blanca de la col (*Pieris brassicae*), Mariposa de los muros, maculada (*Pararge aegeria*), Mariposa ícaro (*Polymmatus icarus*), Mariposa vanesa (*Vanessa atalanta*)



OBSERVACIONES FLORA

Especies en foliación y floración observadas este mes

Salao borde (Salsola oppositifolia)

Cantueso (Thymus moroderi)

Campanilla rosa (Convolvulus althaeoides)

Trébol hediondo (Psoralea bituminosa)

Lletsó marí (Launaea fragilis)

Jopo (Orobanche portoilicitana)

Cola de liebre (Lagurus ovatus)

Pegamoscas (Ononis natrix)

Ajonje (Andyala ragusina)

Cardones, azotacristos (Carthamus lanatus)

Escarchada (Mesembryanthemum crystallinum)

Gordolobo (Verbascum sinuatum)

Mirto (Myrtus communis)



El Myrtus communis, arbusto originario de la cuenca del Mediterráneo, ligado estrechamente a la diosa griega Venus. Ha sido una planta muy valorada tanto por sus usos, como como por su simbología (amor y belleza). La palabra "myrtos" proviene del griego, que significa "perfume", del cual podréis disfrutar en el jardín del aula de la naturaleza de El Clot de Galvany.



4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

Debido a la situación de alerta, parte de las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes de Mayo se han visto reducidas:

- Poda y limpieza del jardín del aula.
- . Tareas de limpieza y mantenimiento del vivero.
- Desbroce del entorno del jaulón de anátidas para facilitar la realización de los trampeos.
- Riego de los tarays del nuevo observatorio de la charca central.
- Instalación de caja nido nº 10 en la charca de limícolas.
- Labores de limpieza y mantenimiento del vivero.
- · Supervisión y alimentación de la cerceta pardilla.
- Trampeo de fartet (pez autóctono) en la charca de anátidas.



INFORME MENSUAL









