ABRIL
2021

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL
CLOT DE GALVANY
ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	9

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Nulo
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Medio
	Central	Medio
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Medio
	Anátidas	Alto
	Fartet	Nulo

OBSERVACIONES

Durante el mes de Abril, las lluvias nos han acompañado durante al menos 14 días y se han recogido un total de 68,5 litros en precipitaciones. A pesar de este mes lluvioso, no ha sido suficiente para que aparezcan láminas de agua tanto en el Fondet de la Senieta como en Torre Brissó. El resto de charcas naturales del Clot de Galvany siguen a un buen nivel manteniéndose respecto al mes anterior. En cuanto a las charcas artificiales, la charca de anátidas mantiene un nivel alto y la nueva charca artificial (antigua charca de limícolas) presenta un nivel medio, dando paso a la aparición de fauna acuática en la misma.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
Especie	**TOTAL**
Alcatraz atlántico	1
Gaviota de audouin	7
Larus sp	25
Total	33

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Cormorán grande	5
Garceta común	1
Chorlitejo patinegro	2
Correlimos tridáctilo	22
Vuelvepiedras común	4
Gaviota picofina	2
Gaviota patiamarilla	6
Totales.-	42

BOLETÍN FAN CLOT

Papamoscas cerrojillo *(Ficedula hypoleuca)*

El papamoscas cerrojillo o papamosques blanquet es un ave migrante que podemos observar durante los pasos migratorios, entre principios de abril y el mes de mayo (paso primaveral) y en septiembre-octubre (paso otoñal). Es bastante inquieto, sacudiendo las alas y levantando continuamente la cola. Desde una rama despejada acecha a insectos voladores que captura en vuelo. En primavera, los machos adquieren un plumaje negro o marrón muy oscuro en las partes superiores, con una llamativa mancha blanca en la frente y un extenso panel blanco en las alas. Fuera de la época de reproducción tanto el macho como la hembra poseen un plumaje de color pardo claro por el dorso y blanco ocre en las partes inferiores. En el Clot se pueden observar entre las ramas de pinos, olivos, algarrobos y tarays.

BOLETÍN FAN CLOT

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	6		Garza imperial	3
Águila calzada	1		Garza real	4
Águila pescadora	1		Halcón peregrino	1
Alcaudón común	3		Malvasía cabeciblanca	13
Andarríos bastardo	7		Martín pescador común	1
Andarríos chico	10		Martinete común	19
Avetorillo común	3		Mosquitero musical	7
Avoceta común	1		Mosquitero papialbo	1
Cerceta carretona	1		Mosquitero silbador	1
Chorlitejo chico	2		Oropéndola europea	1
Colirrojo real	1		Pagaza piconegra	4
Collalba gris	3		Pájaro-moscón europeo	2
Curruca carrasqueña	2		Papamoscas cerrojillo	4
Curruca zarcera	1		Papamoscas gris	1
Flamenco común	29		Pardillo común	2
Fumarel cariblanco	30		Somormujo lavanco	15
Garceta grande	2		Tarabilla norteña	1
Garcilla cangrejera	12		Tarro blanco	2

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Lagartija cenicienta
Culebra viperina
Galápago leproso
Rana común
Lagarto bético
Salamanquesa común
Salmanquesa rosada
Rana común
Erizo
Ardilla roja
Zorro
Conejo
Vanesa de los cardos *(Vanessa carduii)*
Polilla *(Lasiocampa trifolii)*
Caballito del diablo (*Ischnura elegans*)
Libélula *(Crocothemis erythraea)*
Libélula *(Anax parthenope)*

Conejo común (*Oryctolagus cuniculus)*

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración observadas este mes
Lirio menor (*Gynandriris sisyrinchium*)
Campanilla rosa (*Convolvulus althaeoides*)
Hierba estoque (*Gladiolus illyricus*)
Albaida (*Anthyllis cytisoides*)
Cuernecillo marino (*Lotus creticus*)
Amapola(Papaver rhoeas)
Boja blanca *(Dorycnium pentaphyllum)*
Capellanes *(Cardaria draba)*
Bracera marina *(Centaurea seridis)*
Viborera *(Echium creticum)*
Acebuche *(Olea europaea)*

La amapola *(Papaver rhoeas)* es una planta anual de entre 20 y 60 cm, fácil de reconocer por su vistosa flor formada por 4 grandes pétalos de color rojo escarlata y unas anteras oscuras. La podemos encontrar entre los meses de marzo y julio en los márgenes de caminos o terrazas de cultivo. ¿Sabias que? Cada amapola puede llegar a producir unas 20.000 semillas de menos de un milímetro que crecerán meses después.

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

·Limpieza y desbroce del canal de comunicación entre la nueva charca artificial y la de Anátidas.
·Retirada de bolsones de procesionaria en ruta 2.
·Pintado de la pérgola del vivero y de las señales del observatorio de la nueva charca artificial.
·Recolocación de cajas nidales por subida de nivel de la charca central.
·Reparación de talanqueras.
·Preparación de semilla y posterior semillado de cambronera.
·Desbroce en frontal y laterales del observatorio de la charca de anátidas.
·Desbroce del vivero y acceso principal del paraje.
·Revisión perimetral, miradores y vallado del Carabassí.
·Limpieza y mantenimiento de la charca del jardín.
·Reparación de caminos.
·Tareas de limpieza y mantenimiento en merendero y parking.

BOLETÍN FAN CLOT