Enero
2024



Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL
CLOT DE GALVANY
ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Alto
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Alto
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante este primer mes del año, en el Clot de Galvany tan solo se han registrado un acumulado de 7 l/m2 en precipitaciones. A pesar de ello, las charcas naturales, se mantienen en un nivel alto, excepto el Fondet de la Senieta que sigue nulo como el resto de año. Las charcas artificiales se mantienen estables debido a los continuos aportes de agua por parte de la EDAR de Arenales del Sol.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	**TOTAL**
Alcatraz atlántico	1
Cormorán moñudo	1
Cormorán grande	12
Vuelvepiedras común	9
Chorlitejo patinegro	2
Correlimos tridáctilo	14
Gaviota picofina	1
Gaviota de Audouin	4
Gaviota ptiamarilla	18
Larus sp.	20
Charrán patinegro	4
Zarapito trinador	1
Total	**55**

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Correlimos tridáctilo	60
Gaviota patiamarilla	7
Cormorán grande	6
Gaviota de Audouin	7
Gaviota (Larus sp)	16
Vuelvepiedras común	19
Gaviota picofina	1
Charrán patinegro	1

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Agachadiza común	5	Flamenco común	16
Aguilucho lagunero occidental	3	Focha común	395
Ánade azulón	51	Focha moruna	1
Ánade friso	13	Gallineta común	26
Andarríos grande	1	Garceta común	8
Archibebe oscuro	2	Garcilla bueyera	2638
Avetorillo común	2	Garza real	6
Calamón común	1	Malvasía cabeciblanca	11
Cerceta común	39	Martín pescador común	2
Cernícalo vulgar	1	Mochuelo europeo	1
Charrán patinegro	4	Pato colorado	21
Chorlitejo patinegro	2	Porrón europeo	108
Chorlito dorado europeo	278	Porrón pardo	12
Cigüeñuela común	2	Rascón europeo	1
Cormorán grande	33	Somormujo lavanco	1
Cormorán moñudo	1	Vuelvepiedras común	19
Correlimos tridáctilo	60	Zampullín común	51
Cuchara común	189	Zampullín cuellinegro	7

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Salamanquesa rosada
Rana común
Conejo
Ardilla roja
Jabalí
Zorro
Larva de luciérnaga mediterránea (*Nyctophila reichii)*

Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii)

Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*)

El Aguilucho lagunero occidental es una rapaz de tamaño medio que presenta un alto dimorfismo sexual, siendo el macho más pequeño, ligero y, en general, con tonalidades más claras que la hembra. Esta última es bastante más grande, pesada y presenta un plumaje más oscuro, salvo en la cabeza, la garganta y los hombros, donde el plumaje es más blanquecino.

Como su nombre indica, suele distribuirse por humedales con extensas formaciones de carrizos, eneas o juncos, en los que puede instalar sus nidos, hacer dormideros y cazar. Se alimenta de todo tipo de vertebrados, tanto terrestres como acuáticos, como roedores, conejos, aves, reptiles, anfibios, peces e incluso grandes insectos y huevos.

El aguilucho lagunero está incluido como especie reproductora en la Lista Roja de las Aves de España, con la categoría de Preocupación Menor. Su principal amenaza es la alteración y desaparición de hábitats, el uso de pesticidas y la contaminación por plomo.

OBSERVACIONES FLORA

Murajes (*Anagallis arvensis*)

El murajes es una pequeña planta herbácea anual que suele distribuirse en zonas de cultivos, márgenes de caminos y terrenos abandonados. Su rasgo más llamativo son sus flores, que pueden ser anaranjadas o azuladas. Esta diferencia cromática se debe a la disponibilidad de metales pesados en el suelo y está relacionada con el pH. Las flores anaranjadas aparecen en terrenos ácidos, mientras que las de color azulado se presentan únicamente en suelos alcalinos.

Se trata de una especie entomófila, ya que sus flores son polinizadas por insectos y siguen un horario establecido: se abren por la mañana, atrayendo a los insectos en los días soleados, y se cierran en las primeras horas de la tarde. En días nublados y durante la noche, permanecen cerradas para proteger su preciado polen del viento, el frío y la lluvia.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
IES Misteri D'Elx	Ruta guiada y recogida de residuos	100
CP Toscar	Ruta independiente	50
Particulares	Aniversario del Clot de Galvany	33
Particulares	Ruta independiente	30
TCAF	Ruta independiente	20

BOLETÍN FAN CLOT

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Desbroce del mirador de la charca de anátidas.
- Riego del Jardín del aula.
- Retirada de la V Exposición del Photoclot del aula de la naturaleza.
- Desbroce de caminos colindantes a la charca de anátidas.
- Cambio de varios pulsadores de grifos y urinarios.
- Reparación del vallado cinegético en la zona de las dunas del Altet.
- Desbroce de camino del observatorio nuevo de la charca central.
- Desbroce del entorno del observatorio de la charca de anátidas.
- Tareas de semillado en el vivero.
- Desbroce de las motas de la charca de anátidas y entorno del jaulón de aclimatación.
- Reparación del cartel de indicación al Clot en la carretera de acceso al parquing.
- Reparación del cartel y acceso peatonal al paraje desde Arenales del Sol.

BOLETÍN FAN CLOT