

Septiembre
2025

CLOT Fan
Club

BOLETÍN FAN CLOT



Excel·lentíssim
AJUNTAMENT
D'ELX



Aigües d'Elx





BOLETÍN FAN CLOT

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11



BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Medio
TORRE BRISSÓ		Nulo
CLOT DE GALVANY	Norte	Bajo
	Sur	Medio
	Central	Medio
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Medio
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Septiembre cayeron 38 l/m2 en el Clot de Galvany. En cuanto al nivel de las charcas artificiales, mantienen un nivel alto. Por otro lado, las charcas naturales, continúan descendiendo su nivel casi a diario, es mas patente en la charca norte y charca central donde destaca el aumento de la superficie de orillas en los márgenes, muy interesantes para la observación de aves limícolas como señalamos en los boletines anteriores.



2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

CENSO RAM AVES

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	TOTAL
Gaviota reidora	20
Gaviota de audouin	12
Gaviota patiamarilla	12
Larus sp	14
Charrán patinegro	7
Vuelvepiedras común	6
Total	56

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
ESPECIE	TOTAL
Cormorán grande	2
Garcilla bueyera	9
Garceta común	1
Zarapito trinador	1
Vuelvepiedras común	10
Gaviota picofina	1
Gaviota cabecinegra	2
Gaviota de Audouin	8
Gaviota patiamarilla	96
Charrán patinegro	36
Totales	166



MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	28	Flamenco común	98
Agachadiza común	3	Garcilla bueyera	70
Águila calzada	1	Garcilla cangrejera	10
Aguilucho cenizo	1	Gavilán común	1
Aguilucho lagunero occidental	4	Malvasía cabeciblanca	37
Ánade friso	18	Martín pescador común	5
Ánade rabudo	3	Morito común	99
Andarríos bastardo	1	Pájaro-moscón europeo	1
Andarríos chico	8	Papamoscas cerrojillo	2
Andarríos grande	2	Papamoscas gris	1
Archibebe claro	1	Pato colorado	8
Calamón común	3	Perdiz roja	13
Cerceta carretona	2	Petirrojo europeo	3
Cerceta común	3	Porrón europeo	18
Cerceta pardilla	36	Porrón pardo	8
Chorlitejo chico	16	Rascón europeo	2
Cigüeñuela común	28	Somormujo lavanco	7
Colirrojo real	3	Torcecuello euroasiático	3
Correlimos pectoral	1	Tórtola europea	3
Cuchara común	312	Zampullín común	85
Curruca carrasqueña occidental	3	Zampullín cuellinegro	47



BOLETÍN FAN CLOT

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Culebra viperina
Lagartija colilarga
Camaleón común
Rana común
Salamanquesa rosada
Conejo
Ardilla roja
Mariposa tigre (<i>Danaus chrysippus alcippus</i>)
Oruga y polilla (<i>Utetheisa pulchella</i>)
Mariposa del madroño (<i>Charaxes jasius</i>)
Libelula centinela colilarga (<i>Orthetrum trinacria</i>)
Libélula escarlata (<i>Crocothemis erythraea</i>)
Libélula (<i>Diplacodes lefebvrii</i>)
Milpiés (<i>Ommatoiulus sp</i>)



Lagartija colilarga (*Psammodromus algirus*)



Camaleón común (*Chamaeleo chamaeleon*)

El camaleón (*Chamaeleo chamaeleon*) Es un reptil de cuerpo arqueado y comprimido lateralmente. Las extremidades son larga, la cola prensil. Su color de fondo es muy variable.

Sus ojos son prominentes, su lengua larga capaz de ser proyectada a gran distancia.

El color de fondo lo pueden cambiar a voluntad, reflejando ello su estado anímico, factores ambientales o el rango de cada individuo.

La época de reproducción se extiende desde Julio a Septiembre

De movimientos lentos y alimentación insectívora, aunque los grandes ejemplares pueden capturar lagartijas o pollos. Viven en dunas costeras y lugares cercanos al mar

En el Clot su presencia deriva posiblemente de la suelta de ejemplares por parte de coleccionistas en áreas no muy alejadas del paraje, unido al gran poder colonizador de la especie.

Sus principales enemigos son la predación, la pérdida de hábitats y los atropellos durante la reproducción.





Correlimos pectoral (*Calidris melanotos*)

El correlimos pectoral es una pequeña ave limícola perteneciente a la familia Scolopacidae. Se distingue por su pecho finamente rayado de color pardo oscuro que contrasta con el vientre blanco, rasgo que le da su nombre común. Su plumaje dorsal es marrón con tonos oliváceos y moteado, lo que le permite camuflarse fácilmente en los ambientes costeros o húmedos que frecuenta. Mide entre 20 y 23 centímetros de longitud y posee un pico recto y medio largo, adaptado para buscar pequeños invertebrados en el barro o la arena.

En España, el correlimos pectoral es una especie migratoria irregular y escasa, que se observa principalmente durante los pasos migratorios de primavera y, sobre todo, de otoño. No cría en la península, pero aparece como visitante en zonas húmedas y marismas, especialmente en la mitad oriental. En el Clot de Galvany a penas tenemos 4 citas de este ave y siempre en septiembre en el paso postnupcial (2006,2011 y 2025), también se han registrado avistamientos en lugares como la Albufera de Valencia, las lagunas de Pego-Oliva o el marjal dels Moros. Estos humedales costeros ofrecen las condiciones ideales para su descanso y alimentación durante las migraciones. Su presencia, aunque esporádica, añade valor a la biodiversidad de estos ecosistemas y demuestra la importancia de conservar las áreas húmedas como puntos clave en las rutas migratorias de las aves.



3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	Actividad	Participantes
Grado Biología. U.A. Dpto. Ecología.	Prácticas Ecología «Comunidades y poblaciones»	120
Particulares	Actividad de limpieza «1m2 por las playas y los mares»	9
C. Jesús María	Estancia merendero y ruta independiente	50
Particulares	Taller teórico-práctico «Las libélulas y caballitos del diablo en el Clot»	43
Particulares	Ruta guiada	8





BOLETÍN FAN CLOT





4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Revisión de las nasas de seguimiento de galápagos leprosos.
- Desbroce y poda de los accesos a los observatorios de la charca central.
- Arreglo del vallado cinegético en el camino del Carabassí.
- Reparación y sustitución del cañizo en el camino del Carabassí.
- Retirada de las protecciones del nido de la tortuga boba en la playa del Carabassí.
- Mantenimiento y riego del Jardín del Aula.
- Mantenimiento (pintura) de distintas señales del paraje.
- Desbroce del entorno del vivero.
- Desbroce del jaulón para la adaptación de la cerceta pardilla criada en cautividad y del área de anillamiento.
- Instalación de nueva cartelería en los aseos del merendero.
- Arreglo del mirador de la Charca Sur- Torre-Brissó.
- Retirada y limpieza de las nasas de control de galápagos por fin de temporada.
- Arreglo de talanqueras en la Ruta 2.
- Recogida de muestras de agua.
- Limpieza y mantenimiento del vivero.
- Se inician los trabajos de limpieza de carrizo en la charcas artificiales.
- Limpieza y mantenimiento del jaulón del jaulón del nenúfar blanco.
- Retirada de talanqueras en los alrededores de la charca de anátidas.



BOLETÍN FAN CLOT

