

Enero
2026

CLOT Fan
Club

BOLETÍN FAN CLOT



Excel·lentíssim
AJUNTAMENT
— D'ELX —



Aigües d'Elx





ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11



BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Medio
TORRE BRISSÓ		Medio
CLOT DE GALVANY	Norte	Medio
	Sur	Medio
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Enero recogimos 28 l/m2 en el Clot de Galvany, En cuanto al nivel de las charcas artificiales, se mantienen todas en un nivel alto. Por otro lado, en las charcas naturales también se mantienen los niveles del mes anterior.





2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

CENSO RAM

AVES

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	TOTAL
Alcatraz atlántico	5
Cormorán grande	2
Gareta común	1
Correlimos tridáctilos	6
Vuelvepiedras	13
Gaviota reidora	1
Gaviota de Audouin	26
Gaviota oatiamarilla	32
Larus sp	10
Charrán patinegro	2
Total	98

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
ESPECIE	TOTAL
Alcatraz atlántico	3
Cormorán grande	4
Cormorán moñudo	3
Garceta común	1
Chorlitejo patinegro	8
Correlimos tridáctilo	9
Vuelvepiedras común	11
Gaviota reidora	34
Gaviota de Audouin	8
Gaviota patiamarilla	43
Charrán patinegro	6
Total	130



MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Agachadiza común	1	Gavilán común	1
Águila calzada	2	Golondrina común	1
Aguilucho lagunero occidental	6	Halcón peregrino	1
Alcaraván común	13	Lavandera cascadeña	2
Ánade friso	8	Malvasía cabeciblanca	90
Andarríos grande	1	Mosquitero común	22
Avión común occidental	2	Pardillo común	2
Avión roquero	30	Pato colorado	54
Busardo ratonero	4	Petirrojo europeo	6
Calamón común	2	Pinzón vulgar	2
Cerceta común	40	Porrón europeo	146
Cerceta pardilla	14	Porrón pardo	8
Colirrojo tizón	3	Rascón europeo	2
Cuchara común	424	Silbón europeo	1
Curruca capirotada	4	Tarabilla europea	1
Curruca carrasqueña occidental	2	Torcecuello euroasiático	2
Focha moruna	3	Zampullín común	55
Garza real	4	Zampullín cuellinegro	14



BOLETÍN FAN CLOT

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Libélula <i>Sympetrum striolatum</i>
Galápago leproso
Salamanquesa común
Zorro rojo
Conejo
Salamanquesa rosada
Mariposa almirante rojo (<i>Vanessa atalanta</i>)



Salamanquesa rosada (*Hemidactylus turcicus*)




Pato colorado (*Netta rufina*), macho arriba, hembra abajo.

El pato colorado es el pato buceador más grande de los existentes en nuestra fauna.

El macho adulto, en plumaje nupcial, es un ave prácticamente inconfundible, que luce un intenso color castaño rojizo en la cabeza y la parte anterior del cuello, así como un llamativo pico de color rojo coral. La hembra adulta, por su parte, presenta un plumaje sumamente discreto, con la parte anterior de la cabeza y los lados del cuello blanquecinos, la frente, la parte posterior del cuello y el manto marrones, y un pico de color gris oscuro con manchas rosáceas cerca del extremo. El joven resulta muy semejante a la hembra, pero con el pico completamente oscuro.

Aunque el pato colorado se revela como una especie omnívora, la mayor parte de su alimentación es de origen vegetal, plantas acuáticas de fondo, a las que añade diversos animalillos acuáticos de pequeño tamaño, como renacuajos, moluscos, crustáceos, larvas y pececillos.

Especie bastante exigente en cuanto a la calidad del hábitat para instalarse, en el Clot la podemos encontrar durante todo el año en todas las charcas, incluso se ha podido observar su reproducción, indicador de la buena conservación del paraje.





Bufalaga (*Thymelaea hirsuta*)

La *Thymelaea hirsuta*, conocida popularmente, entre otros nombres, como Bolaga, Bufalaga marina (catalán), es un arbusto perenne que raramente alcanza los dos metros de altura y forma una mata con ramas superiores que cuelgan.

Florece desde mediados de invierno hasta bien entrada la primavera. Después, vuelve a florecer tras las primeras lluvias del final del verano y otoño, cuando aun hace calor. Las flores son amarillas, habitualmente unisexuales, muy pequeñas y de cuatro piezas, que hacen que esa planta sirva de hospedante de insectos beneficiosos o útiles. Al florecer en otoño e invierno los insectos tienen la posibilidad de alimentarse de su néctar y polen, que resulta difícil encontrar en esa época del año, lo que les lleva a localizar signos de insectos plaga para alimentarse.

Su distribución es mediterránea y en el Clot se puede ver en las zonas más áridas, pedregosas y secas. Entre sus usos populares, se puede destacar su uso como escoba, gracias a la resistencia de sus tallos y ramas ha servido para utilizarlas como argollas por donde pasar la cuerda que subía el cubo de agua de los pozos, sus tallos trenzados sirven para confeccionar sogas y cuerdas, además de ser un excelente combustible, por lo que su madera ha sido utilizada como leña para hornos.



3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	Actividad	Participantes
IES San Pascual	Ruta guiada	50
IES Joanot Martorell (PAC)	Ruta guiada	9
IES Montserrat Roig	Ruta independiente	26
Centro ocupacional Doctor Esquerdo	Ruta guiada	17
IES L'Allusser	Ruta guiada	55
Particulares	Ruta guiada	11
Particulares	Ruta guiada	4
Aniversario Clot	Ruta especial	33





BOLETÍN FAN CLOT





4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Mantenimiento del vivero y su entorno.
- Desbroce y limpieza de las albitanas del aula de la naturaleza.
- Riego y mantenimiento del jardín del Aula de la naturaleza.
- Toma de muestras de agua de las diferentes charcas del paraje.
- Limpieza y retirada de ramas en el merendero.
- Limpieza de los dos extremos embozados del desagüe de la charca de Tarays.
- Se reparan distintas talanqueras a lo largo del paraje.
- Retirada de flora invasora (*Lantana camara*, *Nicotiana glauca*, *Schinus terebinthifolius*, *Pennisetum setaceum* y *Cylindropuntia sp*) por todo el paraje.
- Limpieza y revisión de los búnkers del paraje.
- Mantenimiento del jaulón de las cercetas pardillas y desbroce de la zona.
- Cambio de malla de jaulón de nenúfar
- Desbroce del seto del camino Carabassí.
- Búsqueda de puntos para la colocación de cámara para el proyecto IRIS.
- Desbroce en la zona de las ruinas romanas.
- Reparación panel información en la torre de observación de la charca Sur-Torre Brissó.
- Limpieza y desbroce del camino de acceso y de los observatorios de Anátidas y Carabassí.
- Revisión y retiradas de ramas rotas por el efecto del viento.
- Tareas de mantenimiento y realce de sabinas en el huerto semillero.

