

Junio
2026



BOLETÍN FAN CLOT



Excel·lentíssim
AJUNTAMENT
— D'ELX —



Aigües d'Elx





ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11



BOLETÍN FAN CLOT

1. NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Medio
TORRE BRISSÓ		Alto
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Alto
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Junio apenas se han recogido precipitaciones en el Clot de Galvany (0,4 l/m²). En cuanto al nivel de las charcas artificiales, se mantienen todas en un nivel alto. Por otro lado, las charcas naturales mantienen todavía un nivel alto aunque la superficie de saladar inundado comienza a retroceder



2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

CENSO RAM

AVES

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	TOTAL
Charrán patinegro	12
Gaviota de Audouin	3
Gaviota patiamarilla	17
Larus sp	6
Total	38

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
ESPECIE	TOTAL
Gaviota de Audouin	9
Gaviota patiamarilla	97
Charrán patinegro	10
Total	116



MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	2
Ánade friso	38
Archibebe claro	1
Avetorillo común	2
Busardo ratonero	1
Calamón común	2
Canastera común	9
Carricero común	7
Carricero tordal	5
Cerceta pardilla	20
Charrán común	3
Charrancito común	3
Cigüeñuela común	7
Críalo europeo	2
Flamenco común	23
Focha moruna	3
Fumarel cariblanco	43
Garceta grande	1

Garcilla cangrejera	6
Garza imperial	1
Garza real	3
Gaviota picofina	3
Gaviota reidora	9
Golondrina común	20
Golondrina dáurica	5
Malvasía cabeciblanca	43
Martinete común	12
Morito común	50
Pardillo común	7
Pato colorado	78
Porrón europeo	51
Somormujo lavanco	7
Tarro blanco	2
Tórtola europea	6
Zampullín común	66
Zampullín cuellinegro	60



BOLETÍN FAN CLOT

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagarto bético
Ardilla roja
Rata de agua
Lagartija colilarga
Culebra de escalera
Salamanquesa rosada
Galápago leproso
Rana común
Conejo
Zorro rojo
Rata parda
Mariposa del madroño (<i>Charaxes jasius</i>)
Libélula <i>Sympetrum fonscolombii</i>
Libélula Anax parthenope
Esfinge colibrí (<i>Macroglossum stellatarum</i>)
Vanesa de los cardos (<i>Vanessa cardui</i>)
Caballito del diablo (<i>Erythroma viridulum</i>)
Araña tigre (<i>Argiope lobata</i>)



Caballito del diablo (*Erythroma viridulum*)



Pollo de Carbonero común(*Parus major*)

El carbonero común es una especie relativamente común y fácilmente reconocible por el color amarillo de sus partes ventrales, que contrasta con el azul de las alas y la cola. La cabeza es de color negro con las mejillas blancas. Los machos se diferencian de las hembras por presentar una banda negra que recorre su cuerpo desde la garganta hasta la base de la cola. Las hembras y los jóvenes tienen muy poco marcada esa banda.

El reclamo más común es un repetitivo chichipán en primavera, aunque tiene un amplio repertorio.

Es una especie bastante extendida en el mundo y España que solo se ausenta de áreas totalmente deforestadas.

Es principalmente sedentaria, forestal aunque no requiere bosques extensos. Su dieta es insectívora.

Inicia la reproducción en marzo, pudiendo sacar más de una pollada. El nido es construido en oquedades naturales y artificiales, siendo la especie que mejor acepta las cajas-nido. Pone entre 8 y 13 huevos, y los incuba solo la hembra durante 12 –14 días. Son alimentados por ambos sexos y vuelan a las 3 semanas.

En el paraje lo podemos encontrar en áreas arboladas,(pinares, tarays, chopos....) y es una de las especies que suele criar en el paraje.

No hay amenazas evidentes para la especie. Es común aunque no abundante.





BOLETÍN FAN CLOT



Gordolobo (*Verbascum sinuatum*)

El gordolobo o planta del llanto es una planta herbácea bienal, el primer año forma solo una roseta de hojas grandes, lobuladas y onduladas pegadas al suelo. El segundo año saca unos tallos de más de 1 cm de grosor, con hojas mas pequeñas y múltiples en ramas. Supera el metro de altura y esta muy ramificada en forma corimbosa, que nos recuerda a un candelabro. Toda la planta esta cubierta de una pelusa aterciopelada blanca por pelos estrellados. Las flores son amarillas, de hasta 3 cm, con 5 estambres cubiertos de pelos violáceos. Podemos disfrutar de esta floración de mayo/junio hasta julio/octubre.

Antiguamente se utilizaba sus hojas para trenzar mechas para candiles y antorchas (el tallo desecado) y las flores para extraer tintes de color amarillo para tinter los cabellos de rubio. Como todas las variedades del género se utilizaban también sus hojas y flores machacadas para enverbascar (que deriva del nombre genérico), envenenar o emponzoñar los charcones de los arroyos ya que contiene alcaloides, de acción relajante, que atontan a los peces y así pueden ser fácilmente capturados. En la Comunidad Valenciana, se le llama ploranera (llorona) o tientayernos. El célebre botánico Pío Font Quer explica que, si se golpea ligeramente el tallo de la planta, sus flores abiertas comienzan a desprenderse una a una. Parece literalmente que la planta se pone a "soltar lágrimas" o resistirse a los golpes, lo que le otorga ese folclórico nombre.

Crece en terrenos abiertos, secos y soleados, es típica de bordes de camino, campos de cultivo. Aguanta bien los suelos pobres y el clima mediterráneo. En el Clot podemos verla en los márgenes de la senda que nos lleva al saladar.



3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	Actividad	Participantes
Particulares	Día mundial del Medio Ambiente	24





4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Toma de muestras de agua de las diferentes charcas del paraje.
- Revisión de las nasas de los galápagos.
- Mantenimiento y limpieza del vivero.
- Desbroce de caminos en distintos puntos del paraje.
- Limpieza de bunkers y mantenimiento de los mismos.
- Retirada de ramas caídas de taray en el entorno de la charca de anátidas.
- Riego y mantenimiento del jardín del aula.
- Sustitución de la puerta de acceso a la charca del Carabassí.
- Revisión de los cuadros eléctricos con personal de Aquambiente.
- Se retiran los techos de 3 pérgolas del área recreativa y se ponen nuevos.
- Desbroce del frontal del observatorio de la charca de anátidas.
- Instalación del vallado para posibles nidos de tortuga boba.
- Limpieza del quemadero, retirada de restos vegetales.
- Ruta en barca por la charca central, detectando nido de ardeidas.
- Mantenimiento de las nasas para control de galápagos.



BOLETÍN FAN CLOT

